

مددجوی عزیز:

باسلام و آرزوی سلامتی برای شما، امیدواریم از لمظاتی که در کنار شما بودیم رضایت کافی داشته باشید و هر چه سریعتر به آغوش خانواده و جامعه بازگردید. این پمفلت آموزشی جهت افزایش اطلاعات شما و پیشگیری از عوارض آن در اختیار شما قرار گرفته است.

سپسیس

تعریف:

سپسیس (عفونت خون) زمانی اتفاق می افتد که میکروب در ریه، روده ها، مجاری ادراری و مثانه یا خون، سمی تولید می کند که به سیستم ایمنی بدن حمله می کند. می تواند بسیار خطرناک باشند زیرا در صورتیکه درمان نشود بر روی کلیه ها، ریه ها، مغز و گوش اثرات خطرناکی خواهد گذاشت.

سپسیس نوزادی دو نوع دارد

سپسیس اولیه:

در هفته اول زندگی دیده می شود اغلب در 24 ساعت اول زندگی تظاهر می یابد. عفونت اغلب از مادر گرفته می شود. ممکن است به وسیله باکتری یا عفونت حاصل از مادر در طول بارداری، زایمان زودرس، جدایی پرده ها (جفت) که بیش از 24 ساعت طول بکشد، عفونت جفت و مایع آمنیوتیک در طول زایمان ایجاد شود.



سپسیس ثانویه:

نوع دوم بعد از زایمان حاصل میشود. ممکن است به وسیله تجهیزات آلوده بیمارستان، در معرض قرار گرفتن داروهایی که منجر به مقاومت آنتی بیوتیک می شوند. داشتن یک کاتتر در یک رگ برای مدت طولانی، ماندن در بیمارستان به مدت طولانی و ... ایجاد می شود.

علائم

- 1- کم شیر خوردن یا عدم شیر خوردن
- 2- تب 38 درجه سانتی گراد و بالاتر از آن (به طریق مقعدی) در نوزادان تا یک ماه
- 3- زجر تنفسی (تلاش تنفسی) یا تنفس غیر عادی
- 4- تغییر رنگ پوست (رنگ پریده یا کبود)
- 5- خواب آلودگی و بی تفاوتی
- 6- تغییر در تن صدای نوزاد و یا گریه های جیغ مانند و بیش از حد
- 7- تغییر در تن عضلانی، سفتی یا شلی خاص
- 8- کاهش یا افزایش ضربان قلب نسبت به حد طبیعی
- 9- تورم یا برجستگی ملاحظه (فونتانلها) در نوزادان
- 10- هرگونه تغییر رفتار یا حرکتی که شما را نگران کند.

همه علائم و نشانه ها به این معنی نیست که فرزندتان مبتلا به سپسیس است اما در شیرخواران زیر 3 ماه باید فوراً کنترل شود تا مطمئن شویم که اشتباهی رخ نداده است

	عنوان سند: سپسیس	
	شماره سند: ۲۹-S-P-BH- شماره ویرایش: 01 شماره بازنگری: 01 تاریخ تدوین: اردیبهشت 95- تاریخ بازنگری: دی 95- تاریخ ویرایش: دی 95	

سپسیس (عفونت خون)

SEPSIS

(آموزش به مددجو)

کمیته آموزش به بیمار

بیمارستان و زایشگاه بنت الهدی

منبع: نوزادان نلسون

آدرس: مشهد - فیابان بهار

bentolhospital@yahoo.com

تلفن تماس: 5- 05138590051

کانال تلگرامی: @bentohospital

عملکرد قلب، و داروهای تنفسی را برای کمک به تنفس موثر در نوزاد شروع می کنند.



هشدارها

وجود هرگونه عفونت در نوزادان یا شیرخواران در مقایسه با اطفال و بالغین بسیار خطرناکتر خواهد بود. در این گروهها سیستم ایمنی به خوبی شکل نگرفته است و هنوز توان مقابله با انواع عفونتها را پیدا نکرده، به همین علت است که گفته می شود

باید درمان عفونت نوزادان در بیمارستان صورت گیرد. شیرخواران زیر 2 ماه، بیشتر مستعد عفونت خون (سپسیس) هستند زیرا سیستم ایمنی آنها هنوز بقدر کافی جهت دفع برخی از منابع عفونی، رشد نکرده است. اگر درجه حرارت بدن شیر خوار 38 درجه سانتیگراد و علائمی شبیه خواب آلودگی، کم اشتهايي و مشکل تنفسی داشته باشد، بهتر است به پزشک مراجعه کنید.

تستهای آزمایشگاهی

تست خون (شامل شمارش گلبولهای سفید و قرمز خون) و کشت خون نشان آزمایش ادرار ممکنست LP (آزمایش مغز نخاع) انجام شود که بستگی به سن و علائم نوزاد دارد.

عکس از قفسه سینه

نمونه برداری از ترشحات:

اگر نوزاد هر نوع لوله گذاری در بدن داشته باشد (آنژیوکت، کتتر یا سنت) از مایع داخل آن ممکنست جهت بررسی علائم عفونت نمونه گرفته شود.

درمان

نوزاد مبتلا به سپسیس یا حتی موارد مشکوک به آن، در بیمارستان جهت درمان بستری می شوند و با دیدن علائم عفونت نهفته، پزشکان آنتی بیوتیکهای تزریقی را برای مقابله با عفونت در نوزاد شروع می کنند. قطعا، پزشکان برای عفونت نوزادان، آنتی بیوتیک تراپی را حتی قبل از تشخیص قطعی، شروع می کند. اگر علائم ظاهر شود داروهای تنظیم فشار خون و بهتر نگهداشتن